



Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

# Programa de Prevención de la Fibrosis quística y del Retardo Mental

El test del piecito es el primer paso para evitar el retardo mental

¿Como se hace?



1. Completar todos los datos de la hoja de toma de muestra. Esto permitirá ubicar al bebé en caso de estar afectado.



2. Sujetar al bebé mientras se le extrae la muestra de sangre como muestra el dibujo.



3. La zona sombreada muestra el área donde puede hacerse la punción sin peligro.



4. Limpie el área con un algodón empapado en alcohol. Deje secar antes de la punción.



5. Haga una punción en el talón. Limpie la primera gota de sangre y deje que se forme otra gota de sangre.



6. Acerque el papel de filtro al pie y deje que la sangre sea absorbida. Cuide que el papel de filtro no toque la piel del bebé.



7. Deje que absorba una cantidad suficiente para los análisis.



8. Deje secar al aire libre por 4 horas y envíe en el sobre correspondiente al laboratorio.



Cantidad insuficiente para la prueba  
Muestra rasgada o desgastada  
La muestra no se secó antes del envío  
Muestra sobresaturada  
Diluida o contaminada  
Exhibe anillos de suero  
Muestra con coágulos

9. Muestras rechazadas.

Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental.

Centro de Salud N° 9  
Dirección: Herminio Giménez c/ Gral. Aguiar  
Telefax: 204 675  
Casilla de correo: 70.000  
Asunción - Paraguay



Apoya:

